

A.1. Tehničke karakteristike za Osiguranje lica – kolektivno kombinovano

1. Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se najmanje navedeni nesrećni slučajevi („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polis osiguranja)

Rb.	Rizik
1.	Gaženje
2.	Sudar
3.	Udar električne energije ili groma
4.	Pad
5.	Okliznuće
6.	Survavanje
7.	Ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama
8.	Ubadanje nekim predmetom
9.	Ujed neke životinje
10.	Trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava
11.	Infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem
12.	Trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesionalnih oboljenja;
13.	Opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl.
14.	Davljenje ili utapanje
15.	Ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest
16.	Gušenje ili ugušivanje usljed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja
17.	Istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spoljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi
18.	Djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slučaja koji se neposredno prije toga desio, usljed spasavanja ljudskog života, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti
19.	Djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja
20.	Udarac životinje, udar o kakav predmet

2. Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja u okviru tačke 1. mora najmanje sadržati navedena pokrića i procenite isplate sume osiguranja („najmanje“ znači da ponuđač garantuje pokriće navedenih karakteristika ili u

uslovima osiguranja ili će se obavezati da prihvati takvu obavezu kroz ugovor o osiguranju ili kroz samu polis osiguranja).

Difuzna oštećenja mozga sa klinički utvrđenom slikom dekortikacije odnosno decerebracije: - hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom; - demencija (Korsakovljev sindrom); - obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom; - kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija; - epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom; - psihoza iza organske povrede mozga.	100%
oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom: - hemipareza sa jako izraženim spasticitetom; - ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta); - pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smijehom; - oštećenje malog mozga sa izraženim poremedajima ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta	Do 90%
Pseudobulbami sindrom	80%
Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promjenama ličnosti, bolnički evidentiranim, nakon bolničkog liječenja sa odgovarajućim ispitivanjima	70%
Žarišna oštećenja mozga sa bolnički evidentiranim poslasticama psihoorganskog sindroma, sa nalazom psihijatra i psihologa nakon bolničkog liječenja sa odgovarajućim ispitivanjima: a) u lakom stepenu b) u srednjem stepenu c) u jakom stepenu	Do 40% Do 50% 60%
Hemipareza ili disfazija a) u lakom stepenu b) u srednjem stepenu c) u jakom stepenu	Do 30% Do 40% 50%
oštećenje malog mozga sa adiadohokinezom i asinergijom	40%
Epilepsija sa rijetkim napadima uz medikaciju: a) bez napada uz redovnu medikaciju b) sa rijetkim napadima uz medikaciju	20% 30%
Kontuzione povrede mozga: a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog neurološkog nalaza poslije bolnički utvrđene kontuzije mozga;	Do 20% 20%

b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada	
Stanje poslije trepanacije svoda lobanje, loma baze lobanje ili svoda lobanje rentgenološki verifikovano	10%
Postkomocioni sindrom poslije bolnički ili ambulantno utvrđenog potresa mozga, uz postojanje posttraumatske amnezije, nakon opservacije bar 4 sata, utvrđenog izvornom medicinskom dokumentacijom, dobijenom u roku od 24 časa nakon povrede.	Do 5%
Gubitak vlasišta: a) tredina površine vlasišta b) polovina površine vlasišta c) čitavo vlasište <i>Napomena:</i> Kod lica koja su već prije bila ćelava, invaliditet se određuje analogno kao unakaženost	5% 15% 30%
Potpuni gubitak vida na oba oka	100%
Potpuni gubitak vida na jedno oko	33%
Oslabljenje vida jednog oka - za svaku desetinu smanjenja - u slučaju da je na drugom oku vid oslabljen za više od tri desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povrijeđenog oka određuje se	3,30% 6,60%
Diplopija kao trajna i ireparabilna posledica povreda oka a) eksterna oftalmoplegija b) totalna oftalmoplegija	Do 10% Do 20%
Gubitak očnog sočiva a) afakija jednostrana b) afakija obostrana	Do 20% Do 30%
Djelimična oštećenja mrežnjače i staklastog tijela a) djelimični ispad vidnog polja kao posledica posttraumatske ablacije retine b) opacitales corporis vitrei kao posledica traumatskog krvaranja u staklastom dijelu oka	Do 5% 5%
Midrijaza kao posledica direktne traume oka	5%
Potpuna unutrašnja oftalmoplegija	10%
Povrede suznog aparata i očnih kapaka a) epifora b) entropium, ektropium c) ptoza kapka	Do 5% Do 5% Do 5%

Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja po vanjskoj izopteri usled direktne povrede oka, prema Goldmanovoj metodi: a) do 50 stepeni b) do 30 stepeni c) do 5 stepeni	Do 5% Do 15% Do 30%
Homonimna hemianopsija usled povrede optičkog nerva	30%
Potpuna gluvoća na oba uha sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa	40%
Potpuna gluvoća na oba uha sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa	60%
Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom	Do 5%
Potpuna gluvoća na jednom uhu nakon povrede: a) sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa b) sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu	15% 20%
Obostrana nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa obostrano: ukupni gubitak sluha po Fowler – Sabine: a) 20 – 30% b) 31 – 60% c) 61 – 85%	Do 5% Do 10% Do 20%
Obostrana nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: ukupni gubitak sluha po Fowler – Sabine: a) 20 – 30% b) 31 – 60% c) 61 – 85%	Do 10% Do 20% Do 30%
Jednostrana teška nagluvost sa urednom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90 – 95 decibela	Do 10%
Jednostrana teška nagluvost sa ugaslom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa: gubitak sluha na nivou 90 – 95 decibela	Do 15%
Povrede ušne školjke: a) djelimični gubitak ili djelimična deformacija b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija	5% 10%
Fraktura kostiju lica, zarasla sa dislokacijom dokazanom RTG snimcima	Do 10%
Ograničeno otvaranje usta nakon frakture čeljustnih kostiju: a) razmak gornjih i donjih zuba – do 4 cm b) razmak gornjih i donjih zuba – do 3 cm c) razmak gornjih i donjih zuba – do 1,50 cm	5% 15% 30%

Defekti na čeljusnim kostima, na jeziku ili nepcu, sa funkcionalnim smetnjama:	Do 10%
a) u lakom stepenu	Do 20%
b) u srednjem stepenu	Do 30%
c) u jakom stepenu	
Gubitak stalnih zuba:	1%
a) do 16 za svaki zub	1,50%
b) 17 i više, za svaki zub	
Pareza facijalnog živca poslije frakture sljepočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:	do 7% do 10%
a) u lakom stepenu	do 20%
b) u srednjem stepenu	30%
c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tokom mimičke muskulature	
d) paraliza facijalnog živca	
Povrede nosa:	
d) otežano disanje uslijed frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno poslije povrede	5%
e) djelimičan gubitak nosa	Do 15%
f) gubitak čitavog nosa	30%
Anosmia sa laboratorijski dokazanom likvorejom	5%
Promjena oblika piramide nosa sa deformacijom kosti:	Do 5%
a) u lakom stepenu b) u srednjem stepenu	Do 10%
c) u jakom stepenu	Do 15%
Povrede dušnika:	5%
a) stanje poslije traheotomije kod vitalnih indikacija nakon povreda	10%
b) stenoza dušnika poslije povrede grkljana i početnog dijela dušnika	
Stenoza dušnika radi koje se mora trajno nositi kanila	Do 30%
Trajna organska promuklost zbog povrede	Do 5%
a) slabijeg inteziteta	Do 15%
b) jačeg inteziteta	
Suženje jednjaka:	Do 10%
a) u lakom stepenu b) u srednjem stepenu	Do 20%
c) u jakom stepenu	Do 30%
Potpuno suženje jednjaka sa trajnom gastrostomom	60%
Fraktura najmanje dva rebra zarasla sa dislokacijom sa zadebljanjem jednog cijelog rebra:	1%
a) dva rebra	2%
b) za svako dodatno rebro	5%

c) fraktura sternuma, ako je zarastao sa dislokacijom sa čitavim zadebljanjem sternuma	
Smanjena funkcija pluća nastala kao rezultat serijske frakture rebara ili prodirudih povreda grudi, poststraumatskih adhezija, ili restriktivnih poremedaja: a) 20 – 30% smanjen vitalni kapacitet b) 31 – 50% smanjen vitalni kapacitet c) 51% ili više smanjen vitalni kapacitet	Do 10% Do 20% Do 30%
Fistula nakon empiema usled povrede	20%
Hronični pludni apsces usled povrede	30%
Gubitak jedne dojke usled povrede: a) do 50 godina života b) preko 50 godina života	20% 10%
Gubitak obje dojke usled povrede: a) do 50 godina života b) preko 50 godina života	30% 15%
Teško oštećenje jedne dojke usled povrede: a) do 50 godina života b) preko 50 godina života	10% 5%
Posledice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša: a) srce sa normalnim elektrokardiogramom b) sa promijenjenim elektrokardiogramom prema težini promjene c) oštećenje krvnih sudova d) aneurizma aorte sa implantantom	30% do 60% 15% 40%
Povrede dijafragme: a) stanje nakon prsnuda dijafragme u bolnici neposredno nakon povrede verifikovano i hirurški zbrinuto b) dijafragmalna hernija – recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile	Do 10% Do 15%
Postoperativna hernija poslije laparotomije koja je rađena zbog povrede	Do 5%
Povreda crijeva, jetre, slezine, želuca: a) sa šivenjem b) povreda crijeva ili želuca sa resekcijom c) povreda jetre sa resekcijom	15% 20% 30%
Gubitak slezine (SPLENECTOMIA): a) do 20 godina starosti b) preko 20 godina starosti	25% 20%
Povreda gušterače sa resekcijom, u vezi sa funkcionalnim posledicama	Do 20%
Anus praeter naturalis – trajni a) tankog crijeva b) debelog crijeva	50% 40%
Sterkoralna fistula	40%

Trajni prolapsus recti usled povrede mišića dna karlice	20%
Incontinentia alvi trajna nakon utvrđene povrede a) djelimična b) potpuna	do 20% 40%
Gubitak jednog bubrega uz normalnu funkciju drugog	30%
Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog: a) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije	Do 40% Do 60%
Funkcionalna oštećenja jednog bubrega: a) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije	Do 15% Do 20%
Funkcionalna oštećenja oba bubrega: a) u srednjem stepenu do 50% oštećenja funkcije oba bubrega b) u jakom stepenu preko 50% oštećenja funkcije oba bubrega	Do 30% Do 60%
Smetnje pri uriniranju zbog trajnog suženja povrijeđene mokradne cijevi (uretre)	Do 20%
Potpuna inkontinencija urina zbog oštećenja vanjskog uretralnog sfinktera	30%
Posttraumatske trajne urinarnе fistule mokradnih kanala, mokradnog mjehura ili uretre	40%
Oštećenja mjehura sa urodinamično smanjenim kapacitetom: c) do 50% smanjenog kapaciteta d) iznad 50% smanjenog kapaciteta	Do 10% Do 30%
Neurogeni mjehur usled povrede nerava karlice dokazan neurofiziološki	20%
Gubitak jednog testisa: a) do 60 godine života b) preko 60 godina života	15% 5%
Gubitak oba testisa: a) do 60 godine života b) preko 60 godina života	40% 20%
Gubitak penisa: a) do 60 godine života b) preko 60 godina života	50% 30%
Deformacija penisa: a) sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života b) sa onemogućenom kohabitacijom preko 60 godina života	50% 30%
Dokazana impotencija zbog oštećenja živaca zdjeličnog dna: a) do 60 godina života b) nakon 60 godine života	30% 10%

Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:	30%
a) gubitak materice	15%
b) za gubitak svakog jajnika	
Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:	10%
a) gubitak materice	5%
b) za gubitak svakog jajnika	
oštećenja vulve i/ili vagine koja onemogućavaju kohabitaciju	50%
a) do 60 godina života	15%
b) preko 60 godina života	
Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine (tetraplegija, paraplegija, triplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja	100%
Povreda kičmenog stuba sa trajnim oštećenjem kičmene moždine (tetrapareza, tripareze) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja	Do 90%
Povreda kičme sa paraplegijom bez poremedaja defekacije i uriniranja	80%
Povreda kičmenog stuba sa trajnom parezom donjih ekstremiteta:	Do 30%
a) u blažem obliku b) u težem obliku	Do 50%
Smanjena pokretljivost kičme kao posledica preloma pršljena uz promjenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):	Do 20%
a) u lakom stepenu	Do 30%
b) u srednjem stepenu	Do 40%
c) u jakom stepenu	
Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede vratnog segmenta:	Do 10%
a) u lakom stepenu	Do 20%
b) u srednjem stepenu	Do 30%
c) u jakom stepenu	
Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela torakalnog segmenta:	Do 5%
a) u lakom stepenu	Do 10%
b) u srednjem stepenu	Do 15%
c) u jakom stepenu	
Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela lumbalnog segmenta:	Do 15%
a) u lakom stepenu	Do 20%
b) u srednjem stepenu	Do 35%
c) u jakom stepenu	
Serijski prelom 3 ili više:	5%
a) spinalnih nastavaka kičme	Do 10%
b) poprečnih nastavaka kičme	

Kompresovani prelom pršljenova, sa ograničenom pokretljivošću	2%
Višestruki nestabilni prelom karlice zarastao sa dislokacijom fragmenata ili zglobova (Si ili simfize)	30%
Stabilni prelom karlice zarastao sa dislokacijom fragmenata ili zglobova	Do 5%
Nezarasli prelomi u predjelu karlice	15%
Stanja po prelomu krstačne kosti u području SI zglobova zarastao sa dislokacijom	10%
Trtična kost: a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom ili operativno odstranjen slomljeni fragment b) operativno odstranjena trtična kost	Do 5% 10%
Gubitak obje ruke ili šake	100%
Gubitak ruke u ramenu (eksartifikulacija)	70%
Gubitak ruke u području nadlaktice ili zglobu lakta	65%
Gubitak ruke ispod lakta	60%
Gubitak šake	55%
Gubitak svih prstiju na obje ruke	90%
Gubitak palca	20%
Gubitak kažiprsta	12%
Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta: a) srednjeg b) domalog ili malog, za svaki prst	6% 3%
Gubitak cijele metakarpalne kosti palca	6%
Gubitak cijele metakarpalne kosti kažiprsta	4%
Gubitak cijele metakarpalne kosti srednjeg, domalog i malog prsta, za svaki	3%
Ankiloza ramenog zgloba	30%
Ograničena pokretljivost u ramenom zglobu nakon loma koštanih struktura i uganuda:	do 20%
Stanje nakon iščašenja ramenog zgloba riješeno sa artroskopijom ili operacijom	2%
Labavost ramenog zgloba sa koštanim defektom zglobnih tijela	do 15%
Lom ključne kosti zarastao sa dislokacijom ili prikradenjem	3%
Djelimično uganude (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba vidljivo na RTG slici:	3%
Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba vidljivo na RTG slici	10%
Endoproteza ramenog zgloba	30%

Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom	15%
Paraliza živca akcesoriusa	15%
Paraliza brahijalnog pleksusa, dokazana radiklografijom ili MEP: a) avulzuja korjena brahijalnog pleksusa b) avulzija 2-4 korjena brahijalnog pleksusa c) oštećenje cijelog brahijalnog pleksusa	5% do 40% 60%
Paraliza aksilarnog živca	15%
Paraliza radijalnog živca	30%
Paraliza živca medianusa	20%
Paraliza živca ulnarisa	20%
Paraliza dva živca jedne ruke	do 50%
Paraliza tri živca jedne ruke	70%
Ankiloza lakatnog zgloba	25%
Ograničena pokretljivost lakatnog zgloba nakon loma koštanih struktura ili uganuda	Do 20%
Labavost lakatnog zgloba	Do 15%
Endoproteza lakatnog zgloba	25%
Ankiloza podlaktice u supinaciji	25%
Ankiloza podlaktice u srednjem položaju	15%
Ankiloza podlaktice u pronaciji	20%
Ograničena pokretljivost podlaktice a) supinacija b) pronacija	do 7,5% do 7,5%
Ankiloza ručnog zgloba	25%
Ograničena pokretljivost ručnog zgloba nakon frakture zglobne strukture ili dislokacije	Do 15%
Endoproteza navikularne i/ili lunarne kosti	10%
Endoproteza ručnog zgloba	25%
Potpuna ukočenost svih prstiju jedne ruke	40%
Potpuna ukočenost čitavog palca	15%
Potpuna ukočenost čitavog kažiprsta	9%
Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta a) čitavog srednjeg prsta b) domalog ili malog prsta, za svaki	4% 2%
Prelom metakarpalnih kostiju: a) nepravilno saniran prelom i metakarpalne kosti b) za ostale metakarpalne kosti II,III, IV i V-e za svaku kost	3% 1%
Nepravilno zarastao Benettov lom palca	5%
Lom na prstima II. Do V. zarastao sa Angulacijom prsta	2%
Ograničena pokretljivost distalnog ili bazalnog članka palca nakon frakture ili dislokacije	Do 6%

Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta nakon frakture ili dislokacije	Do 2,5%
Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova nakon frakture ili dislokacije: a) srednji prst b) domali ili mali prst	Do 2% Do 1%
Gubitak obje natkoljenice	100%
Aksartikulacija noge u kuku	70%
Gubitak noge iznad koljena ili u koljenskom zglobu	55%
Gubitak obje noge ispod koljena	80%
Gubitak potkoljenice	45%
Gubitak oba stopala	80%
Gubitak jednog stopala	35%
Gubitak stopala u Chopartovoj liniji sa ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	35%
Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji sa ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	30%
Transmetatarzalna amputacija sa ograničenom pokretljivošću skočnog zgloba	25%
Gubitak prve ili pete metatarzalne kosti	5%
Gubitak druge, trede i četvrte metatarzalne kosti, za svaku	3%
Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi	20%
Gubitak palca na nozi: a) gubitak krajnjeg članka palca b) gubitak cijelog palca	5% 10%
Gubitak čitavog II – V prsta na nozi, za svaki prst	2,5%
Djelimični gubitak II – V prsta nozi, za svaki prst	1%
Ankiloza kuka	35%
Ankiloza oba kuka	70%
Nereponirano iščašenje kuka	40%
Deformirajuda artroza kuka nakon povrede zglobnih tijela sa ograničenom pokretljivošću	Do 30%
Endoproteza kuka	30%
Ograničena pokretljivost kuka bez deformirajude artroze	Do 15%
Nepravilno zarastao lom bedrene kosti sa angulacijom ili rotacijom: a) 10 do 20 stepeni b) preko 20 stepeni	Do 10% 15%
Hronični osteomielitis kostiju donjih udova sa fistulom	10%
Cirkulacijske promjene nakon penetralne povrede velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta	10%
Skradenje ili produženje noge uslijed preloma: Od 2 cm, za svaki cm	2%
Ukočenost koljena:	35%

Deformirajuda atroza koljena poslije povrede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost	Do 20%
Umanjena pokretljivost koljena nakon preloma zglobnih tijela i	
uganuda, bez deformirajude artroze	Do 15%
Labavnost koljena poslije povrede kapsule i ligamentarnog aparata, verifikano adekvatnim dijagnostičkim metodama (UZ, artroskopija): a) prednji ključni ligamenti testirano po Nosbergeru b) zadnji ključni ligamenti testirani po Nosbergeru c) kolateralni ključni ligamenti	Do 6% Do 8% 1%
Djelimično odstranjanje meniskusa pradenom svježom povredom	2,5%
Odstanjenje meniskusa u cjelosti, nakon svježije povrede sa disfunkcijom	5%
Endoproteza koljena	30%
Slobodno zglobno tijelo usled povrede koljena	2,5%
Odstanjenje patele: d) parcijalno odstranjena patela e) totalno odstranjena patela	Do 5% 10%
Traumatska hondromalacija palette rengenološki potvrđena	5%
Nepravilno zarastao prelom tibije uz valgus, varus ili recurvatum deformacijom: a) od 5 – 15 stepeni b) preko 15 stepeni	Do 10% Do 20%
Ankiloza skočnog zgloba	30%
Umanjena pokretljivost skočnog zgloba: ili diskolacija c) nakon loma koštane strukture ili dislokacije d) nakon kidanja ahilove tetive usled direktnog udara ili posjekotine	Do 15% 2%
Endoproteza skočnog zgloba	25%
Nepravilno zaliječen prelom maleola sa proširenjem razmaka između maleola RTG verifikovano, sa eventualnom funkcionalnom smetnjom	do 20%
Deformacija stopala: pes eskavatus, pes planovalgus, pes varus, pes ekvinus sa eventualnom funkcionalnom smetnjom: a) u lakom stepenu b) u jakom stepenu	5% 10%
Deformacija kalkaneusa poslije kompresivnog preloma sa mogudim funkcionalnim poremedajima	10%
Deformacija talusa nakon preloma sa deformirajudom artrozom sa mogudim funkcionalnim smetanjama	Do 15%

Stanje nakon preloma tarzalnih kostiju	5%
Deformacija jedne metatarzalne kosti nakon preloma za svaku – ali ukupno ne više od 10%	2%
Ukočenost krajnjeg zgloba palca na nozi	1,5%
Ukočenost osnovnog zgloba palca na nozi ili oba zgloba	3%
Ukočenost osnovnog zgloba II – V prsta, za svaki prst	0,5%
Deformacija ili ankiloza	0,5%
a) od II – V prsta na nozi u savijenom položaju (digitus fleksus), za svaki prst	2%
b) prsti u zakrivljenom položaju (Hallus flexus)	
Paraliza ishijadičnog živca	40%
Paraliza femoralnog živca	30%
Paraliza tibijalnog živca	15%
Paraliza peronealnog živca	25%
Paraliza glutealnog živca	10%
Ožiljci od opekotina, prema Lund-u i Browder-u	do 15%
a) do 20% površine tijela	0,188%
b) više od 20% površine tijela	
- za svaki % preko 20% određuje se dodatnih	
Ožiljci pradeni povredama, bez disfunkcije nadlaktice, butne kosti i mišića potkoljenice ili mišićne kile	2%
Ožiljci pradeni povredama, bez disfunkcija:	Do 5%
a) ožiljci na licu	Do 20%
b) na peti ili tabanu usled defekta mekih tkiva	
Ožiljci pradeni operacijama, bez disfunkcije	5%
a) na grudima, ako je vedi od 20 cm	3%
b) na trbušnoj duplji	
Ožiljci koji prate transplataciju kože ili tkiva:	Do 15%
a) do 20% površine tijela	
b) više od 20% površine tijela	
- za svaki % preko 20% određuje se dodatnih 0,188%	

Posebna ugovaranja

- Osiguranje se ugovara prema kadrovskoj evidenciji. Naručilac dostavlja odabranom Ponuđaču početni spisak zaposlenih i mjesečne spiskove za prethodni mjesec;
- Pokrivenost osiguranja: 24h svuda i na svakom mjestu;
- Ne priznaju se isključenja za osigurana lica na bolovanju, odnosno osiguranjem su obuhvaćena i lica koja se nalaze na bolovanju;
- Ne priznaje se karenca, odnosno umanjenje prava osiguranika na bazi karence za slučaj smrti usled bolesti (karenca se priznaje na novozaposlene radnike);

- Premija se plaća mjesečno na bazi početnog spiska zaposlenih; eventualna odstupanja u broju osiguranika se koriguju na kraju godine osiguranja kad se i vrši saldiranje između ugovarača i osiguravača;
- Ne priznaju se umanjenja i ograničenja prava osiguranika, niti isključenja obaveze Osiguravača u vezi sa Corona virusom (COVID 19, SARS-COV-2, mutacije corona virusa i sl).